



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM NİTRAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	31073
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BESTCALNİ
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM NİTRAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:15,5 Amonyak N %:1,1 Nitrat N:14,4
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %:26
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 35 °C
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 07/02/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/01/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu**na göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Bilal ALHAN/ 08.01.2025



EC FERTILIZER

KALSİYUM NİTRAT

GÜBRETAŞ

BESTCALNi

CALCIUM NITRATE

نترات الكالسيوم

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ



TR	GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
	Toplam AZOT (N)	15,5
	Amonyak Azotu (N-NH ₃)	1,1
	Nitrat Azotu (N-NO ₃)	14,4
	Suda Çözünür KALSİYUM OKSİT (CaO)	26

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Önerilen miktarda ürün bir kap içerisinde suda iyice çözündürülüp gübreleme tankına aktarılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraklardan verilebilir. **KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:** Fosforlu ve sülfatlı gübrelerle karıştırılmaz. Tek başına uygulanmalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla önerilen doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

EN	GUARANTEED CONTENT	(W/W) %
	Total Nitrogen (N)	15.5
	Ammonium Nitrogen (N-NH ₃)	1.1
	Nitrate Nitrogen (N-NO ₃)	14.4
	Calcium Oxide (CaO) - Water Soluble	26

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 0.5-25 kg/decare for direct soil application. 2-6 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 200-300 gram per 100 liter water for leaf application.

(W/W) %	AR	محتويات المضمونة
15,5		اجمالي النتروجين (N)
1,1		نتروجين الامونيا (N-NH ₃)
14,4		نتروجين الامونيا (N-NO ₃)
26		أكسيد الكالسيوم (CaO) - قابل للذوبان في الماء 100%

طريقة وكمية التطبيق:

الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط 2-4 كغ مع 1 طن من الماء من أجل 1 ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الاوراق يتم خلط 100 لتر من الماء مع 200-300 غرام من السماد وتطبيقها.

RU	ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(W/W) %
	Общий Азот (N)	15.5
	Аммоний Азот (N-NH ₃)	1.1
	Нитратный Азот (N-NO ₃)	14.4
	Оксид кальция (CaO) 100% Водорастворимый	26

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При применении непосредственного в грунт используется в количестве 0.5-25 кг/декар. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 2-6 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 200-300 г жидкого удобрения.

EC FERTILIZER

KALSİYUM NİTRAT

GÜBRETAS

BESTCALNi

CALCIUM NITRATE

نترات الكالسيوم

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ



Bitki	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) kg/dekar (1 ton su ile)	TOPRAKTAN (Doğrudan Toprağa Uygulama) kg/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide döneminden itibaren hasada kadar	250-300	5-6	20-25
Fasulye-Nohut-Mercimek				
Karpuz-Kavun-Kabak				
Bağ-Kivi	Meyve tutumundan itibaren	200-250	3-5	0,5
Çilek			4-5	20-25
Muz	Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra	300-350	3-5	0,5
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra	250-300		0,5-1
Elma-Armut-Ayva				
Narenciye				
Zeytin				
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	250-300	2-3	10-15
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Yumruların erik iriliğini almasından itibaren		5-6	20-25
Buğday-Arpa-Çeltik	Sapa kalkma döneminden itibaren		-	10-15
Pamuk	Tarakanma döneminden itibaren		2-3	0,5-1
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra		3-4	
Soğan-Sarımsak	Gelişme dönemi boyunca	200-250	2-3	10-15
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)				
Yeşil alanlar - Süs Bitkileri				

NOT: Önerilen miktarlar yaprakdan 10-15 gün ara ile, damla sulamada ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
The best before date is 5 years after the production date.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +35°C
Storage temperature: +5°C / +35°C
Температура хранения: +5°C / +35°C
درجة حرارة التخزين: +5°C / +35°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004

TESCİL NO: