



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SÖZLEŞME SAKLI OLSUN

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSIYUM NİTRAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	31073
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BESTCALNİ
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	KALSIYUM NİTRAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:15,5 Amonyak N %:1,1 Nitrat N:14,4
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 35 °C
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 07/02/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:07/02/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.

Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre, GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
Yeni Gıda ve Madde
Mühürleme Mühür Eski Dk. No: 10-11
34738 GÜBRE FABRİKALARI
Tel: 0216 500 50 50 Faks: 0216 40 10 11

EC FERTILIZER
KALSIYUM NİTRAT
BESTCALNİ



Net **25 kg**

BESTCALNİ

KÜTLECE (W/W) %

Toplam AZOT (N)	15,5
Amonyak Azotu (N-NH ₄)	1,1
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	14,4

KULLANIM YÖNTEMİ VE DOZU: Kullanılacak miktarda ilimum toprak yapıp, sulama sistemi, verim durumu ve yetiştirilecek ürüne göre değişebilir. En uygun doz oranının belirlenmesi için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Kahyaym Nıratı göbürsü, yaprakları ve toprakları her türlü sulama sistemi ile kullanılabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin animal materyaller kullanılmaması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonu doğrultusunda kullanılmalıdır. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Baş gübre tozlarının amacı dışında kullanılmayınız. **DEPOLAMA:** Direkt güneş ışığı almamalıdır, iyi havalandırılmalı, kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Ürünün kokuşmasını önlemek için torbaların ağzını sıkıca kapatınız. Tasirilen ve depolarken ani darbelerden korununuz. Çok sıcakta ve çok ıslakta uzun süre bırakmayınız. **KARİŞİLİRLİLİK DURUMU:** Fostfor ve gütlü gübreninle kesinlikle karıştırmazsınız. Tek başına kullanılmaması tavsiye edilir. **İLK YARDIM:** Göz ve el ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda bol su ile ovulmalıdır yıkamalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARI:** Toprak ve verimya yaprak analizi yaptırarak gübreni kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gütlilerden uzak tutunuz. Yırtmayınız, tenafüs etmeyiniz. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla benzeri doz oranını kullanmayınız. En uygun doz oranını belirmek için GÜBRETAŞ'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 12 torba üst üste yapılmamalı. Tedbir amacıyla, kullandığınız eldiven ve gözleki takınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gübreleme 15.05.2016-30.05.2016	DAMLA SULAMADAN gübreleme 15.05.2016-30.05.2016	TOPRAKTAN gübreleme 15.05.2016-30.05.2016
Domates - Biber - Patlıcan - Hiyar				
Fasulye - Nohut - Mercimek	Fide döneminden itibaren hasada kadar	250 - 300	5 - 6	20 - 25
Karpuz - Kavun - Kabak				
Bağ-Kivi			3 - 5	0.5
Çilek	Meyve tutumundan itibaren	200 - 250	4 - 5	20 - 25
Muz	Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra	300 - 350	3 - 5	0.5
Kiraz - Vişne - Şeftali - Kayısı - Erik				
Elma - Armut - Ayva				
Narenciye	Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra	250 - 300	3 - 5	0.5 - 1
Zeytin				
Haşır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren		2 - 3	10 - 15
Potates - Ş. Pancarı - Havuç	Yumruların erik iriliği aılmasından itibaren		5 - 6	20 - 25
Buğday - Arpa - Çeltik	Sapa kalkma döneminden itibaren		-	10 - 15
Pamuk	Taraklanma döneminden itibaren	250 - 300	2 - 3	10 - 15
Fındık - Ceviz - Antep Fıstığı	Yaprak oluşumu tamlandıktan sonra		3 - 4	0.5 - 1
Soğan - Sarımsak				10 - 15
Yaprak yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vs.)	Gelişme dönemi boyunca		2 - 3	10 - 15
Yeşil alanlar Sus Bitkileri		200 - 250		10 - 15

NOT: Yapraktan önerilen dozlarda 10-15 gün ara ile, demir süzme ve topraktan önerilen dozlarda ise haftalık olarak uygulanır.
Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GUARANTEED CONTENT	MASS (W/W) %
Total Nitrogen (N)	15.5
Ammonium Nitrogen (N-NH ₄)	1.2
Nitrate Nitrogen (N-NO ₃)	14.3

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants.
Applicable at 0.5-25 kg/decare for direct soil application. 2-6 kg of fertilizer is mixed
and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation. 200-500 gram per
100 liter water for leaf application.

TENEUR GARANTIE	EN MASSE (W/W) %
Azote Total (N)	15,5
Azote Ammoniacal (N-NH ₄)	1,5
Azote Nitrique (N-NO ₃)	14

La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de
endement des plantes. Appliquer 0,5 à 25 agriculture directement par la terre.
Mélanger 2 à 8 kg à 1 tonne d'eau pour 1 décare pour les systèmes "trigloin
goutte-à-goutte et mélanger 200 à 300 grammes d'engrais à 100 litres d'eau
pour l'aspersion sur les feuilles.

ГАРАНТИРУЕМЫЙ СОСТАВ	ОТ МАССЫ (W/W) %
Общий Азот (N)	15.5
Аммиачный Азот (N-NH ₄)	1.2
Нитратный Азот (N-NO ₃)	14.3

Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При выращивании бесплодного в грунт используется количество 0,5-25 кг/декар. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 2-6 кг; при поливочном на грядки на 100 литров воды добавляется и размешивается 200-300 г жидкого удобрения.

المحتويات المضمونة	النسبة (W/W) %
أحماض النشويين (N)	10.0
النشويين الأمونيا (N-NH ₄)	5.1
النشويين الأمونيا (N-NH ₄)	1.3

التيمة التي سيتم تطويرها تعبر حسب نوع التثاقف وأسماؤها و قدراتها الإنتاجية يمكن تطبيق 25-30 كغ أدوية كإزال التربة مباشرة في نظم الري بالتنقيط يتم خلط 2-3 كغ مع 1 لتر من الماء من أجل 100 لتر في طريقة التطبيق من الأدوار يتم خلط 3-4 لتر من الماء مع 2-3 غرامين من السمك وتطبيقها

Drum (with or without an embossed identification)
Production and its number is printed on the packaging
La date de fabrication et le N° de lot se trouvent sur l'emballage
Date proizvodnje i broj partije, proizvodnja iz poznatog
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة

Son kullanımı tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
The best before date is 5 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de production.
Срок годности составляет 5 лет с даты производства.
بالتاريخ ٥ سنوات من تاريخ الإنتاج.

Depozitarea scadelor: +5°C / +25°C
Storage temperature: +5°C / +25°C
Temperatura de stocare: +5°C / +25°C
Temperatura de utilizare: +5°C / +25°C
+5°C / +25°C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nispetiye Kule Sokakı 19. Kat Kat: 19 Nispetiye Mah. Beşiktaş / İstanbul
No: 1 Kat: 19-30-31 34732 Katlıyol-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90216 468 50 50 Faks: +90216 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr / www.gubretasah.com



GÜBRETAS

BOOKS BY THE SAME AUTHOR: *COOPERATION IN THE BRITISH COMMONWEALTH*
Buckingham Library No. 204, Buckingham Treaty No. 21872

